

CHARME



Travaux	Observations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Rempotage	Pouzzo 90% Compost 10%			2 à 3 ans									
Emplacement	Pas à coté des rosiers et des chênes	Au froid (-10° maxi)		Soleil			Mi ombre			Soleil		Au froid	
Taille	Arbre en culture	Taille structure											
	Arbre abouti	Taille structure (après la taille, protéger des courants d'air)		Laisser 8 feuilles puis couper à 2 feuilles			effeuillage 1 an sur 2 au maximum						Taille
pincements	Arbre abouti			Branche aboutie, pincer les bourgeons terminaux									
Fertilisation	Faiblement azoté			Pas d'engrais pour limiter la taille des feuilles et les entre-nœuds.		++	++	-	-	+	+		
Ligature	à surveiller de près	Poser les grosses ligatures uniquement (cime par exemple)			Surveiller et/ou libérer	Poser les ligatures de branches				Libérer			
Maladie/traitement	Oïdium + chenille, araignées rouges			Mancozèbe + soufre (tous les mois)								Mancozèbe	

Les branches faibles seront laissées libres de pousser, les branches fortes seront taillées régulièrement pour limiter leur taille.