

# POMMIER

Dès la chute des feuilles., pour conserver une bonne floraison l'année suivante.  
Couper 1/3 à 1/2 des racines.

Travaux	Observations	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Rempotage	Arbre en culture: 90% zéolithe + écorces		1 ans										
	Arbre abouti: 100% zéolithe										2 ans		
Emplacement	Pas à coté des rosiers et des chênes	Au froid (-10°maxi)		Soleil			Soleil (sauf si très fort)			Soleil	Au froid		
Taille	Arbre en culture	Taille structure mimine					Supprimer les fruits						
	Arbre abouti				Taille en vert après la floraison						Taille de structure		
Effeuilage													
Fertilisation	Faiblement azoté		Pas d'engrais pour limiter la taille des feuilles et les entre nœuds.			++	++	-	-	+	+		
Ligature	Privilégier la taille et les haubans (à surveiller de près)												
Maladie/traitement	Oïdium + chenille, araignées rouges			Bouillis								Aliette	

Supprimer les gourmands systématiquement

Les fleurs apparaissent au bout des petites branches (branches de deux, trois ans), il faut laisser des branches tire sèves qui seront supprimées après floraison.